

Patientinformation

Øvelsesprogram til skulderopererede

- Bicepstenodese
- Bicepstenotomi

www.friklinikkenregionsyddanmark.dk

Friklinikken


Region Syddanmark

Denne pjece indeholder øvelsesprogram til dig, der har fået foretaget operation med bicepstenodese eller bicepstenotomi i skulderen. Øvelsesprogrammet retter sig mod de første 6 uger efter operationen, hvor du skal aflaste **albuen**.

Efter et par dage må du bevæge skulderen frit, men du må ikke belaste over albuen de første 6 uger. Det tager 6 uger for den opererede sene at vokse/gro fast på knoglen. I denne periode skal du derfor kun bevæge albuen passivt for at bevare albuefunktionen.

Efter operationen vil der være smerte og hævelse, især de første 2-3 uger.

Armslynge

Du skal have armslyngen på i uger.

Du skal tage armslyngen af, når du laver øvelser, skifter tøj eller bliver vasket. Du skal sove med armslyngen.

Træning

- **Fra operationsdagen til 6 uger efter operationen**

Du må kun lave passive øvelser over albuen. Det vil sige du må ikke bruge musklerne på forsiden af overarmen (biceps) til at bevæge albuen. Når du udfører øvelserne, skal du derfor hjælpe den opererede arm maksimalt med den raske arm. Du må bevæge frit over skulderen.

- **6-12 uger efter operationen**

Du må begynde på aktive øvelser og gradvis belastning over albuen.

- **Fra 12 uger efter operationen**

Fortsat aktive øvelser. Du må begynde på styrketræning, hvor du gradvist øger belastningen.

Træningshyppighed og antal gentagelser per øvelse

Det anbefales at lave øvelserne flere gange dagligt. Begynd med 5-6 gentagelser af hver øvelse. Øg gradvist de første 6 uger op til 10-15 gentagelser per øvelse.

Du må forvente let øget ømhed/ubehag lige efter træningen, men der må ikke være tiltagende smerter i længere tid efter træningen. Er dette tilfældet skal du nedsætte bevægeudslaget for de øvelser, som er smerteprovokerende.

Udspændings- og cirkulationsøvelser

Øvelse 1: Udspænding af nakke - påbegyndes dagen efter operationen

Udgangsposition: Træk hagen ind, og gør nakken lang.

Træning: Næsen føres ned mod brystet.

Bemærk: Denne øvelse udføres med 2 gentagelser.



Øvelse 2: Udspænding af siden af halse - påbegyndes dagen efter operationen

Udgangsposition: Træk hagen ind, og gør nakken lang.

Træning: Venstre øre føres roligt ned mod venstre skulder. Gentag modsat, højre øre føres roligt ned mod højre skulder.

Bemærk: Denne øvelse udføres med 2 gentagelser til begge sider.




Øvelse 3: Cirkulation i arm, bøje og strække fingrene - påbegyndes dagen efter operationen

Udgangsposition: Stå eller sid med ryggen i neutralstilling, behold armen i slyngen.

Træning: Skiftevis knyt hånd og stræk fingrene.

Bemærk: Denne øvelse gentages mange gange i løbet af dagen, gerne en gang i timen.



Passive bevægeøvelser

Øvelse 4: Bøje og strække albue - påbegyndes 2 dage efter operationen

Udgangsposition: Siddende på en stol.

Tag fat omkring håndleddet af den opererede arm.

Træning: Bøj og stræk albuen på den opererede arm med hjælp af den modsatte hånd.

Bemærk: Hold overarmen på den opererede arm fikseret langs siden af kroppen under øvelsen.



Øvelse 5: Dreje albue - påbegyndes 2 dage efter operationen

Udgangsposition: Siddende ved et bord med overarmen ned langs siden af kroppen. Tag fat i underarmen helt nede ved håndleddet.

Træning: Drej underarmen udad så håndfladen vender op mod loftet eller så langt, du er instrueret i.

Drej dernæst underarmen indad så håndfladen vender ned mod bordet eller så langt, du er instrueret i.

Bemærk: Hold overarmen på den opererede arm fikseret langs siden af kroppen under øvelsen.



Passive bevægeøvelser

Øvelse 6: Bevægelse af skulder - påbegyndes 2 dage efter operationen

Udgangsposition: Siddende med ryggen ret. Placer en hånd på hvert lår.

Træning: Læn kroppen fremover og lad hænderne glide ned af benene mod fødderne.

Vend tilbage til udgangspunktet.



Øvelse 7: Bevægelse af skulder - påbegyndes 2 dage efter operationen

Udgangsposition: Gangstående og foroverbøjet ved et bord eller lignende. Lad den opererede arm hænge afslappet ned.

Træning: Flyt vægten frem og tilbage, så armen svinger frem og tilbage uden at føre armen aktivt.



Passive bevægeøvelser

Øvelse 8: Bevægelse af skulder - påbegyndes 1 uge efter operationen

Udgangsposition: Liggende på ryggen med bøjede ben og hænderne bag nakken.


Træning: Før albuerne mod hinanden, og læg dem derefter ned mod underlaget.



Øvelse 9: Bevægelse af skulder - påbegyndes 1 uge efter operationen

Udgangsposition: Liggende på ryggen med bøjede ben.

Træning: Fold hænderne og før armene op mod loftet og videre op mod hovedet med strakte arme. Bliv i yderstillingen i nogle sekunder, inden du fører armene ned igen.



Øvelse 10: Bevægelse af skulder - påbegyndes 2 uger efter operationen

Udgangsposition: Stående med et håndklæde. Tag med den opererede arm fat i håndklædet, som er bag ryggen.

Træning: Træk langsomt med den øverste arm så den opererede arm føres op bag kroppen, til du mærker spænding omkring skulderleddet. Sænk langsomt til udgangsstilling.



Øvelse 11: Bevægelse af skulder - påbegyndes 2 uger efter operationen

Udgangsposition: Stående med en rundstok eller lignende mellem hænderne.

Træning: Før stokken op til den opererede side så højt, som du kan.

Bemærk: Jo længere fra hinanden hænderne er placeret, desto højere kan armene føres op!



Aktive bevægeøvelser

Øvelse 12: Bevægelse af skulder - påbegyndes 2 uger efter operationen

Udgangsposition: Stående med armene strakt langs kroppen. Tommelfingrene vender opad.

Træning: Løft armene strakte ud fra kroppen op over hovedet. Sænk langsomt til udgangsposition.


Bemærk: Det vigtige er, du holder skulderbladene "nede i baglommen". Det vil sige, at skulderen ikke må løfte sig under armens bevægelser. Det skal du sikre ved at se ind i spejl.



Øvelse 13: Bevægelse af skulder - påbegyndes 2 uger efter operationen

Udgangsposition: Stående op ad en væg.

Træning: Løft begge arme op over hovedet så højt, du kan. Hold albuerne strakte, og spænd mave-musklerne under øvelsen.



Øvelse 14: Stabilitetstræning af skulderen - påbegyndes 3 uger efter operationen

Udgangsposition: Stående med hænderne på et bord.

Træning: Læg vægten skiftevis fra den ene hånd til den anden.



Friklinikken, Region Syddanmark
Engparken 1
7200 Grindsted
Telefon 7690 8350
Send sikker mail via hjemmesiden

www.friklinikkenregionsyddanmark.dk

Er der øvelser, der giver dig smerter og hævelse? Så stop med øvelsen, vælg en anden og forsøg med øvelsen igen på et senere tidspunkt.

Husk: træk vejret roligt og kontrolleret under alle øvelserne.

Kontakt Friklinikken

Telefon: 7690 8350 mellem kl. 8.00 - 15.00

De anvendte billeder i denne pjece er fra Caddi.dk